








QUÍMICAS MERISTEM, S.L. · C/ Regaliciar, 7 · Polígono Ind. Moncada II
46116 Moncada (Valencia) ESPAÑA · Tel.: +34 961 394 511
www.quimicasmeristem.com

PROGRAMA DE APLICACIÓN DE **PRODUCTOS BIOESTIMULANTES** EN SANDÍA PARA MEJORAR LA FLORACIÓN Y CUAJADO DE LOS FRUTOS



CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE APLICACIONES



PRODUCTO	OBJETIVO DE APLICACIÓN	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS
 VIGORTEM S	Favorecer el establecimiento del cultivo y el desarrollo vegetativo	1: Aplicar en el primer riego después del riego de enjuague 2: 10-14 días después de la aplicación 1 3: Aplicar en el momento de introducir las colmenas	1-2 kg/ha  2-3 kg/ha  4-5 kg/ha 
 LIDEX PREMIUM	Aumentar la precocidad y mejorar el cuajado de los frutos	1: Aplicar 10 días antes de introducir las colmenas 2: Aplicar en el momento de introducir las colmenas	3-4 kg/ha  3-4 kg/ha 
 MOLIBOR EXTRA	Estimular la aparición precoz de polen y mejora su calidad	1: Aplicar 7 días antes de introducir las colmenas 2: Aplicar 2 días después de introducir las colmenas	150-200 g/100 L  150-200 g/100 L 
 MUDRA PREMIUM	Optimizar el proceso de cuajado de los frutos y minimizar la caída fisiológica de frutitos recién cuajados	1: Aplicar 7-10 días antes de introducir las colmenas 2: Aplicar 2-3 días después de introducir las colmenas	125 g/100 L  125 g/100 L 